



THE HONG KONG ASSOCIATION
OF SPEECH THERAPISTS
香港言語治療師協會



失語症

Aphasia



香港言語治療師協會 HKAST



hkast_ig

什麼是 ...



失語症是指因大腦受損而引起的語言障礙，其中以左腦受損的病人有較大機會患上失語症。

患者的語言理解、表達、閱讀及書寫能力甚至社交語用亦可收到影響。



香港言語治療師協會 HKAST



hkast_ig

特徵



需要較長時間或多次重複才能理解字詞及句子的意思



較難理解複雜的句子或速度太快的說話



有找字困難，需要時間或提示才能想到適當的字詞來表達自己的意思



說話句子簡短，句子結構錯誤



不斷重複某些字詞



嚴重的患者可能會完全不能理解別人的說話或不能說出有意思的句子



對社交場合感到困擾



評估

言語治療師會為患者的語言能力及社交能力作評估，並根據患者的能力和需要而決定合適的治療方法。

治療

治療目的為改善患者的溝通能力以應付日常溝通需要，及提升患者的生活質素。
常用的訓練包括：

- 命名練習
- 理解練習
- 用手勢、書寫或其他溝通工具協助語言表達
- 教導患者家人及照顧者一些溝通技巧



香港言語治療師協會 HKAST



hkast_ig

建議



- ☒ 給予患者充足的時間組織及表達
- ☒ 盡量留意患者的言語及非言語表達，如動作、眼神
- ☒ 減少溝通環境的干擾及雜聲
- ☒ 減慢說話速度，運用簡單及直接的言語與患者溝通
- ☒ 為患者提供不同接受訊息及表達的途徑，如用動作、文字、書寫工具、實物、圖片作輔助
- ☒ 如不能明白患者的說話，請示意並重覆你能明白的部份，使患者不用重覆整句句作修正

