



THE HONG KONG ASSOCIATION
OF SPEECH THERAPISTS
香港言語治療師協會



語音障礙

Speech Sound Disorders



香港言語治療師協會 HKAST



hkast_ig

什麼是 ...



孩子通常在學習說話的過程中，發音都有不標準的情況。隨著言語發展漸趨成熟，發音清晰度亦會隨之改善。有一部份孩子的發音問題會持續，並無法自行改善，便是**語音障礙**。語音障礙可分為音韻障礙及構音障礙兩種。

音韻障礙成因：

- 兒童未能學到音韻系統的規則

構音障礙成因：

- 口腔肌肉協調不佳
- 口腔構造缺損（如：唇顎裂）
- 口腔機能缺失（如：失用症）



特徵



孩子說話時未能發出正確的語音，而常見的語音錯誤可包括：



替代：將某些音取代另一個音，例如：
『狗』變『豆』、『哥』變『多』



省略：將聲母或韻母省略，例如：
『蝦』變『呀』、『鞋』變『崖』



變異：將某些音扭曲，例如：
將舌頭突出牙齒說/s/音

評估

言語治療師會透過評估，找出孩子語音障礙的原因及錯誤規律，從而決定是否需要治療。

治療

- 利用遊戲，配合適當的提示和回饋，幫助孩子掌握正確發音技巧
- 待單字發音正確後，加入相關詞彙和句子練習，逐步達到自行正確發音之效果



建議



- ☒ 留意孩子是否有語音問題，尋找相關資源及評估是重要的一步
- ☒ 孩子接受言語治療時，父母或照顧者應在旁陪同，了解治療方法和訓練進度
- ☒ 每天在家中延續言語課堂的練習
- ☒ 多讚賞、多鼓勵、多練習；語音訓練通常都會有很好的成效